



Dybder paa Havet, hvor det hyppig trækkes op med *Gorgonia placomus* o. fl. Coraller, i hvis Grøne dets mangfoldig deelte Arme indvikles; frisk er det af en smuk minierød Farve. — Som en Sjeldenhed har jeg een eneste Gang fundet en *Comatula*, som meest ligner *C. mediterranea*, Lam. — Igelkærret, *Echinus esculentus*? sidder allevegne paa Klipperne nogle faa Fod under Söens Flade i Mængde. O. F. Müller adskilte denne nordiske Art fra *E. esculentus*, Linn., under Navn af *E. sphæra*, og virkelig forekommer den mig noget forskjellig fra de Exemplarer af *E. esculentus* fra Middelhavet, som jeg har havt Leilighed til at sammenligne med den, ved dens høiere mere kuglerunde Skikkelse, da disse derimod vare mere hemisphæriske, lavere, og deres Grundflade bredere og fladere. — *Cidarites* (*Echinus*) *hystrix*, Lam. (*Prodr. Zool. dan. No. 2848*), denne ved sine overmaade lange Pigge udmærkede Art, er sjeldnere og forekommer i større Dybder i Fjordene. — Af *Spatangus* er *S. pusillus* meget almindelig overalt paa sandig Bund, kjendelig ved dens smaa grønne Pigge; ligesaa paa samme Steder *S. flavescens*, sjeldnere *S. purpureus*. — *Holothurierne* ere ogsaa talrige ved vor Kyst. *H. pentactes*, ofte 6—7" lang, *H. inhærens* hyppig i Sandet tæt ved Stranden, *H. pellucida* paa Tarer; sjeldnere *H. phantapus* og *Fistularia elegans* i Fjordene. *Fistularia mollis*, spec. nov., der meget ligner *F. tubulosa*, men er graahvid af Farve, med 20 minierøde Tentakler, og en ganske blød Hud, er paa nogle Steder (som ved Floröen) yderst almindelig. Næsten alle opholde sig især paa dyndet eller sandig Grund. En Art *Sipunculus*, beskrevet af J. Rathke <sup>1)</sup> er meget hyppig i forskjellige tomme Conchylier, især i *Dentalium entalis*. *Priapul* er her ved Kysten endnu ikke kommen mig for Öie.

---