

peltato-laciniatis, GMELIN, *Syst. nat.* XIII, 1, p. VI, pag. 3142, n. 20.

Fistularia maxima. FORSKAOL, *Descr. anim.*, pag. 121, n. 50, tab. 58, fig. B - b.

LAMARCK, *Hist. des anim. sans vert.*, tom. 3, pag. 76, n. 4.

### 3. H. impatiens — O. impaziente.

Corpore rigido, cinereo; tentaculis viginti filiformibus, apice pelta septemfida denticulatis. GMELIN, *Syst. nat.* XIII, 1, p. VI, pag. 3142, n. 21.

Fistularia impatiens. FORSKAOL, *Descr. anim.*, pag. 221, n. 51, tab. XXXIX, fig. B.

BRUGUIÈRE, *Enc. méth.*, pl. 86, fig. 11.

LAMARCK, *Hist. des anim. sans vert.*, tom. 3, pag. 76, n. 3.

Tentaculis crassis, haud filiformibus, oblongis, ramoso-multifidis, hyalinis, nigro-punctatis; corpore toto albo, supra papillis mammosis conicis, subtus papillis tubulosis longissimis. » Moriens ( Forskaolius ait ) aperit foramen, a capite unguis latitudine distans, unde fila quaedam procedunt. » Hoc autem praeter foramen nunquam vidi, et fila nuncupata ovaiae ramificationes esse puto.

### 4. H. Columnae — O. di Colonna.

Corpore rigido, viridi-fusco; superne papillis mamillaeformibus, subtus tubulosis; tentaculis viginti, multifidis. *Nobis.*

CUVIER, *Règ. anim.*, tom. 4, pag. 22.

Hydra tota fusca. BOHADSCH, *Anim. mar.*

Pudendum regale piscatorium. COLUMN., *Aquatil. hist.*, pag. 26, ic. 1.

### 5. H. Forskaolii — O. di Forskal.

Corpore rigido, nigricante, undique papillis fere tubulosis raris, apice albis, oblecto; tentaculis viginti, longis, hyalino-fuscis, pelta trichotomo-pinatifida. *Nobis.*