

bastanza separati, tranne la filiera esterna, che in grazia dell'epidermide presenta una briglia tra un canale e l'altro. Il longitudinale e trasversale diametro del suo corpo, che vedesi bleu-vellutato, è ben contrassegnato nella figura di Forskahl.

§. II. *O. di Poli*,

Ha venti tentacoli divisi in quattro lobetti laciniati. Nell'anello dell'atrio della bocca evvi una fila di papille cilindriche, e bianche nella metà superiore. La stessa disposizione rilevasi nelle papille del dorso e del piede, le quali ne' tre quarti della loro inferiore lunghezza sono del colorito del suo corpo, che è giallo-nericcio, e bianche nel rimanente. Bisogna avvertire che le ventrali sono più lunghe delle dorsali, e tra queste se ne osservano alcune coniche e ricurve come gli aculei della *R. alba*,

§. III. *O. di Santoro*,

Tiene venti tentacoli lunghi mezzo pollice, e bastantemente larghi nell'apice, che è separato in quattro lobi alquanto profondi; ciascuno de' quali si suddivide in due pezzi, che veggonsi graziosamente incisi. Le papille del dorso talune somigliano ad una poppelina, avendo una zona bianca nella base, e le altre in maggior numero delle precedenti sono appena coniche, e poco rilevate. Nel ventre ha i canalini affolla-

tissimi e lunghi . Que' del margine esteriore , mediante l'epidermide , che si solleva un poco , restano di tratto in tratto insieme uniti . Ha il dorso color tabacco , e'l ventre ceruleo-fosco .

§. IV. *O. di Cavolini .*

È l'*Hydra minor ex fusco lutea* , che Bohadsch diunita all'*Hydra tota fusca* , elevata al posto di specie da Cuvier (1) col nome di *Pudendum regale Fab. Columnae* , credette varietà della *H. tubulosa* , essendosene in seguito perduta la memoria . Attorno alla bocca tiene venti tentacoli , mediocrementemente lunghi , ed incarnatini ; restando ognuno di essi diviso in quattro lobi intagliati . Le sue papille dorsali sono cilindriche , non troppo approssimate , e spesso interrotte da varie altre di figura conica . Quelle della pancia sono cilindriche , ed assai più lunghe della doppia serie delle antecedenti . Tutte le suddette papille colorate veggonsi alla stessa maniera del corpo dell' animale , che è giallo più bruniccio nel dorso , eccetto l' aia terminale delle ventrali , che è bianchiccia .

(1) *Règn. anim. , tom. 4 , pag. 22.*

Fistulariae species non descripta. Tentacula terminata in umbellam e ramis ramulisque clavatis distinguunt speciem hanc. FORSKAOL, *Icon. rer. nat.*, pag. 12, A; tab. XXXIX, fig. A.

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*, an. 1824.

Ob eiusdem raritatem viscera haud examinare potui.

6. H. Poli — *O. Poliana.*

Corpore rigido, castaneo nitente colore; dorsi ventrisque papillis tubulosis, medio superiore tantum albis, dorsalibus rarius conicis, incurvis; tentaculis viginti, laciniatis. *Nobis.*

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*

7. H. Sanctori — *O. di Santoro.*

Corpore rigido, castaneo-subfusco; supra papillis conicis, maioribus basi solummodo albo-vittatis; subtus papillis tubulosis, longissimis, membrana coniunctis; tentaculis viginti, pelta quadrilobato-multifida. *Nobis.*

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*

8. H. Cavolini — *O. di Cavolini.*

Corpore rigido, luteo-fusco, superne papillis tubulosis, rariusque conicis; inferne papillis tubulosis longis, apice area alba confectis; tentaculis viginti, pelta quadrilobata, multifida. *Nobis.*

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*

AN HYDRA MINOR EX FUSCO-LUTEA? BOHADSCHE, *Anim. mar.*

** HOLOTHURIA corpore membranaceo, tentaculis simplicibus.

9. H. Petagnae — *O. di Petagna.*

Corpore molli, sub-luteo; papillis tubulosis hinc atque illic mamillaribus; tentaculis viginti, laciniatis. *Nobis.*

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*

10. H. Stellati — *O. di Stellati.*

Corpore molli, supra nigro-variegato, subtus cinereo; papillis tubulosis, extremitate albis; tentaculis undeviginti, tenuiter incis. *Nobis.*

DELLE CHIAJE, *Diar. medico-chirurg. Tirolens.*