

b) SPORADIPODES.

Pedes abdominales sine ordine in abdomine sparsi.

α) Tentacula peltata. (*Aspidochirotae*.)

10. Genus. HOLOTHURIA\*).

Corpus vel elongatum, cylindricum vel in abdomine plus minusve plenum et minus cylindricum. Anus rotundus, inermis.

*Subgen. THELENOTA.*

Dorsum, ob pedes dorsales admodum evolutos, mammosum vel verrucosum.

*Sect. a. Camarosoma.*

Corpus admodum elongatum, plerumque cylindricum, in dorso convexo plus minusve mamillis evolutis obsessum, rarius verrucis dorsalibus admodum evolutis subquadrangulare.

- Spec. 1. HOLOTHURIA *tubulosa* vel tremula Auct. Tiedemann Anatom. Taf. 1.; Encycl. méthod. tab. 86. fig. 12.
- Spec. 2. HOLOTHURIA *elegans*. Müll. Zool. dan. tab. 1 et 2; Encyclop. tab. 86. fig. 9 et 10.
- Spec. 3. HOLOTHURIA *impatiens*. Forsk. Faun. arab. p. 121. Tab. 39. F. B. b.; Encyclop. méth. tab. 86. fig. 11. — Trepang *impatiens* Jaeger Holoth. p. 25.
- Spec. 4. HOLOTHURIA *umbrina*. Rüppel et Leuckart. Atlas. pag. 10. Tab. 2. fig. 4. a, b.
- Spec. 5. HOLOTHURIA *quadrangularis*. Less. Cent. Zool. Tab. 31. fig. 1. p. 90.
- Spec. 6. HOLOTHURIA *ananas*. Nob. Trepang *ananas*. Jaeger Holoth. p. 24. Tab. III fig. 1.

*Sectio b. Platysoma.*

Corpore modice elongato, dilatato.

- Spec. 7. HOLOTHURIA (*Thelenota*) *grandis* Br.

HOLOTHURIA n. 15. *Mss. Mertensii*.

---

\*) Genus *Holothuria*, qualem nunc proponimus in posterum forsam in plura dividendum erit genera, quorum typi forsam ex parte jam sunt indicati.

Corpus 1 — 2 pedum et ultra longitudine, 4 pollicum et ultra latitudine. Dorsum fusco-ochraceum, paulisper olivaceum, in medio et lateribus eminentiis insignibus, biseriatis, papilliformibus, pediferis fere pectinatum, in laterum margine, nec non in anteriore seu orali corporis parte similibus eminentiis, sed longioribus et magis conicis, fere dentatum. Pedes dorsales et reliquum dorsum verrucis parvis, acuminatis obsessa. Abdomen planum, ferrugineum, pedibus sulphureis, spice aurantiacis, numerosissimis, sparsis, densis instructum. Pars oralis et tentacula ferruginea.

In Insula *Lugunor* Archipelagi Carolinensis.

Spec. 8. ?*HOLOTHURIA monacaria* Less. Cent. Zoolog. tab. 78. p. 225.

*Subgen. Microthele.*

Dorsi pedes parum evoluti, rarius ex eminentiis mamillosis parum distinctis prominentes.

Spec. 9. *HOLOTHURIA (Microthele) maculata* Br.

*HOLOTHURIA* n. 17. *Mss. Mertensii.*

Corpus circiter pedale, 2" latum, supra mamillis sparsis, parum distinctis obsessum, nigricans, sed maculis magnis albis marmoratum, subtus fuscum. Tentacula fusca. Pedes numerosissimi, fuscescentes.

In Insula Guahan.

Observ. Transitum quodammodo facere videtur haec species ad subgenus *Thelenota*.

Spec. 10. *HOLOTHURIA (Microthele) dubia* Br.

*HOLOTHURIA* n. 10. *Mertens. Mss.*

Corpus circiter spithamale et ultra, dorsum fusco-ochraceum, striis duabus longitudinalibus dentatis, albis, parallelis. Tentacula e fuscescente albida, in disco pallide fuscescentia.

In Insulis Bonainsimensibus.