

2. *Holothuria* Linné 1758 (XVII, 2, 3).

(+ *Bohadschia* Jäger 1833 + *Trepang* Jäger 1833 partim
+ *Sporadipus* Brandt 1835 + *Cystipus* Haaeke 1880).

20 oder (seltener) mehr als 20 Fühler; Bauchfläche nicht immer deutlich; die über den ganzen Körper vertheilten Ambulacralanhänge sind entweder nur Füsschen oder nur Papillen oder auf dem Bauche Füsschen und auf dem Rücken Papillen; nur selten sind die Füsschen auf dem Bauche in Längsstreifen geordnet; in der Haut keine C-förmigen Kalkkörper; Genitalschläuche in einem (linken) Büschel; After ohne Kalkzähne, aber manchmal fünfstrahlig.

Literatur: Bell (19, 20, 21, 22); Brandt (33); Delle Chiaje (38, 39); Düben und Koren (54); Forskal (65); Gmelin (69); Grube (81, 85); Gunner (89); Heller (96); Jäger (110); Lampert (134 und *); Lesson (138); Ludwig (147, 149, 154, 156, 157, 160, 161a, 161b); v. Marenzeller (164, 165); O. F. Müller (188); Pourtales (207); Quoy und Gaimard (211); Sars (221); Semper (238, 239); Selenka (229, 230); Sluiter (242 und **); Théel (267, 268).

109 Arten: *aculeata* Semp., *africana* Théel, *albiventer* Semp., *anapinusa* Lamp., *aphanes* Lamp., *argus* (Jäg.), *atra* Jäg., *bowensis* Ludw., *caesarea* Ludw., *captiva* Ludw., *chilensis* Semp., *cinerascens* (Br.), *clemens* Ludw., *coluber* Semp., *cubana* Ludw., *curiosa* Ludw., *decorata* v. Marenz., *dictrichii* Ludw., *difficilis* Semp., *discrepans* Semp., *edulis* Less., *eualia* Lamp., *farcimen* Sel., *flavo-maculata* Semp., *forskalii* Delle Chiaje, *fusco-cinerea* Jäg., *fusco-punctata* Jäg., *fusco-rubra* Théel, *gracilis* Semp., *gräffei* Semp., *grisea* Sel., *helleri* v. Marenz., *humilis* Sel., *imitans* Ludw., *immobilis* Semp., *impatiens* (Forsk. (XVII, 2), *inermis* Bell, *inhabilis* Sel., *inornata* Semp., *intestinalis* Ascan., *kapiolaniae* Bell, *klunzingeri* Lamp., *köllikeri* Semp., *kubaryi* Ludw., *kurti* Ludw.***), *lactea* Théel, *lagoena*

*) Zoolog. Jahrb. IV. 1889.

**) Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. XLIX. Batavia 1889.

***) = *lamperti* Sluit. Sluiter hat bei der Namengebung seiner *H. lamperti* im Jahre 1889 (Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, XLIX, Batavia) übersehen, dass ich bereits drei Jahre früher denselben Speciesnamen an eine ganz andere Holothurienart vergeben habe (160). Es muss also die Sluiter'sche Art wohl oder übel umgetauft werden. Um sie aber dem Forscher, dessen Namen ihr Sluiter gegeben, nicht zu entziehen, möge sie nach dessen Vornamen *H. kurti* heissen.