

MULLER *Zool. Dan.* 1, p. 37, n. 12, tab. X, f. 5,6.

LINN. CUR. GMELIN *Syst. Nat.* p. 3141, n. 13.

BRUGUIERE *Enc. méth. tab.* LXXXVII, f. 5,6.

LAMARCK *Hist. des Anim. sans vert.* tom. III, p. 74, n. 5.

CUVIER *Régn. anim.* tom. IV, p. 23.

BLAINVILLE *Dict. des sc. nat.* tom. XXI, p. 319.

4. H. Doliolum. — *O. botticella.*

Tentaculis 8-10 frondoso-racemosis, corpore 5fariam papilloso-tubuloso.

Actinia doliolum. PALLAS *Misc. zool.* p. 41, tab. IX et X.

BRUGUIERE *Enc. méth. tab.* LXXXVI, f. 6-8.

BLAINVILLE *Dict. des sc. nat.* tom. XXI, p. 317.

5. H. tetraquetra. — *O. a 4faccie.*

Tentaculis denis fondosis, corpore tetraquetra, angulis papilloso-tubulosis serie duplici.

An Doris tetraquetra. PALLAS *Nov. Act. Academ. Petropolit.* tom. II, p. 237, tab. V, f. 22.

LINN. CUR. GMELIN *Syst. Nat.* pag. 3106, n. 18.

6. H. triquetra. — *O. a 3faccie.*

Tentaculis viginti, apice peltato-incisis, corpore triquetra, papillis supra conicis, subtus tubulosis, postice binis elongatis. NOEIS.

Haec species in *pithecusano*, reliquae *neapolitano* mari piscantur.

CAPITOLO V. — *Attinie.*

1. *A. ranciata* (vol. II, p. 438). Corpo spesso conformato a botte, con fascie longitudinali ranciate alternate con altre bianche, rugoso a traverso; tentacoli fibrosi a lungo di molte serie affollati, verdi con estre-