

83. *Holothuria verrucosa* sp. nov.

Taf. XIX. Fig. 88.

Die Warzenfüsschen über den ganzen Körper gleichmässig vertheilt. Die thurmförmigen Kalkkörper sehr plump, 0,048 Mm. hoch, ihre Basis 0,08 Mm. breit, mit 8 schräg aufwärts gerichteten Dornen. Die schnallenförmigen Gebilde 0,03—0,06 Mm. lang, 0,02 Mm. breit. In allen Fusswandungen, nahe dem Endscheibchen, zahlreiche gedornte oder zu durchlöcherten Platten ausgebreitete Stützstäbe. — Schwarz, die Papillen hellbraun; hie und da auch grössere hellbraune Flecke.

Das einzige vorliegende Exemplar ist von schlanker Körperform, 18 Cm. lang. Die Tentakeln stehen in zwei concentrischen Kreisen, die des innern Kreises hellbraun gefärbt; die Disken 3—4 Mm. breit. Kalkring (Fig. 88.) von mittlerer Grösse. Ringcanal weit, Poli'sche Blasen zwei; Steinanäle klein, in einem Büschel. Tentakelampullen gross (20 Mm. lang). Die übrigen Eingeweide waren ausgeworfen.

Sandwich-Inseln (CM.).

Die Haut ist in Folge der massenhaften Entwicklung der Kalkgebilde rau und sandig anzufühlen.

88.

